

# واکسن کشته پاستورلوز طیور



موسسه تحقیقات واکنس و سرم سازی رازی

## نوع و شکل واکنس:

واکنس کشته، به صورت سوسپانسیون

## ترکیبات واکنس:

- باکتری پاستورلامولتوسیداسروتیپ A1 به تعداد حداقل  $4-5 \times 10^9$  CFU/ml
- هیدروکسید آلومینیوم به عنوان یاور
- فرمالدئید به عنوان غیرفعال کننده

## مورد مصرف:

این واکنس برای ایمن سازی فعال علیه بیماری وبای ماکیان، بوقلمون، اردک و غاز تهیه شده است.

## روش مصرف، دز و راه تجویز:

بطری واکنس را به خوبی تکان داده و ۱ میلی لیتر واکنس را از راه عضلانی تزریق نمایید.

## برنامه و زمان مناسب واکنسایون:

- این واکنس را می توان در سنین ۸ تا ۱۲ هفتگی تجویز کرد.
  - در مناطقی که سابقه بیماری وجود دارد توصیه می شود واکنسایون دو بار در سال (بهار و پاییز) انجام گیرد.
  - در مناطق گرم و مرطوب توصیه می شود واکنسایون قبل از شروع فصل بارندگی انجام شود.
- زمان خودداری از مصرف گوشت و تخم مرغ:

ندارد

## موارد منع مصرف:

- از واکنسایون پرندگان بیمار یا ضعیف (دچار سو تغذیه) خودداری شود.
- از تزریق واکنس پس از انقضای تاریخ مصرف خودداری شود.

## عوارض جانبی:

عوارض جانبی ندارد.

## تداخلات دارویی:

از مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی هم زمان با واکنسایون خودداری شود.

## توصیه ها و احتیاط های لازم:

- واکنس از شبکه توزیع رسمی تهیه شده و زیر نظر دامپزشک تجویز شود.
- واکنس طبق برنامه سازمان دامپزشکی کشور تجویز شود.
- به هنگام مصرف واکنس، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.
- از یخ زدن واکنس جلوگیری و در این صورت از مصرف آن خودداری شود.
- تمامی پرندگان سالم موجود در گله به طور هم زمان واکنسین شوند.
- دقت کنید تا واکنس در داخل قفسه سینه تزریق نشود.
- به منظور حفظ یکنواختی، قبل و حین مصرف، بطری حاوی واکنس به آرامی تکان داده شود.
- تمامی محتوای بطری واکنس در روز واکنسایون استفاده شده و از مصرف باقی مانده آن خودداری شود.
- به هنگام واکنسایون از لوازم حفاظت شخصی (عینک، دستکش، ماسک، چکمه و روپوش) استفاده شده و در صورت تزریق اتفاقی واکنس به بدن فرد تزریق کننده، بلافاصله با آب و صابون شستشو داده و به پزشک مراجعه شود.

### نحوه معدوم نمودن باقی مانده و بطری واکسن:

پس از اتمام واکسیناسیون، وسایل یک بار مصرف و بطری خالی/نیمه مصرف واکسن را به طور صحیح سترون سازی (اتوکلاو، سوزاندن، استفاده از مواد شیمیایی مناسب) و دفن بهداشتی نمایید.

### شرایط حمل و نقل و نحوه نگهداری:

این واکسن در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد و دور از نور حمل و نگهداری شود. در این شرایط، واکسن تا تاریخ انقضای درج شده بر روی برچسب قابل مصرف می باشد.

### بسته بندی:

واکسن پاستورلوز طیور در مقادیر ۱۰۰ دزی، در بطری های ۱۰۰ میلی لیتری و در کارتن های ۲۴ تایی بسته بندی و عرضه می شود.

### تاریخ آخرین بازنگری برگه راهنما:

۱۴۰۰/۰۹

### منبع:

1- Office international des epizooties (OIE), 2021, Fowl Cholera, Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, chapter 3.3.9.